



ISCISA –EXAME DE ADMISSÃO ENFERMAGEM GERAL(SÓ PARA ENFERMEIRO GERAL)

1. A lavagem meticulosa das mãos pelos profissionais de saúde e visitantes contribui significativamente para a interrupção do ciclo da infecção:
A. Recorrente
B. Cruzada
C. Vertical
D. Concomitante
2. Lavar as mãos entre um cuidado de enfermagem e outro é importante para:
A. Manter a higiene das mãos
B. Evitar a autocontaminação.
C. Não contaminar o material
D. Evitar a infecção cruzada e a autocontaminação
3. Numa situação de emergência, em que há indicação de intubação endotraqueal, o paciente deverá ser colocado na seguinte posição:
A. Fowler, com a cabeça para o lado.
B. Trendelenburg, com a cabeça flectida para frente.
C. Horizontal, sobre uma superfície firme com a cabeça para trás.
D. Lateral esquerda, sobre uma superfície flexível.
4. A coleta de urina de 24 horas auxilia no diagnóstico de doenças do aparelho geniturinário, sendo imprescindível o seguinte cuidado:
A. Colectar a primeira urina da manhã
B. Desprezar o primeiro jacto de urina
C. Colocar o material em frasco estéril
D. Reiniciar a colecta se alguma micção for desprezada
5. Para realizar a glicosúria pelo método do clinitest, as quantidades necessárias de urina e água, respectivamente, são:
A. 5 gotas e 10 gotas
B. 10 gotas e 5 gotas
C. 10mL e 5mL
D. 5mL e 10mL
6. Hemorragia é a perda de sangue devido ao rompimento de um vaso sangüíneo, veia ou artéria. Quando oriunda do pulmão denomina-se:
A. Metrorragia
B. Hematêmese
C. Aracnóide
D. Hemoptise
7. A perda da continuidade óssea, produzida de forma brusca e violenta como resultado de um traumatismo, denomina-se:
A. Concussão
B. Contusão
C. Entorse
D. Fratura
8. A densidade urinária, verificada por meio do urodensímetro, oscila, quando normal, entre:
A. 1.060 e 1.070
B. 1.055 e 1.060
C. 1.045 e 1.050
D. 1.010 e 1.030
9. A falta de função respiratória, por qualquer causa que se introduza no trajecto gasoso dos pulmões, entre o sangue e o ar ambiente, denomina-se:
A. Dispepsia
B. Anorexia
C. Asfixia
D. Nenhuma das alternativas anteriores
10. O eletrocardiograma fornece informações sobre:
A. Registro dos impulsos elétricos do coração
B. Arritmia cardíaca de repetição
C. Registro das incursões respiratórias
D. Acidose respiratória
11. Indique o procedimento que não deve ser realizado, ao prestar os primeiros socorros a uma pessoa intoxicada com soda cáustica:
A. Colocar a vítima com a cabeça mais baixa que o resto do corpo



ISCISA -EXAME DE ADMISSÃO ENFERMAGEM GERAL(SÓ PARA ENFERMEIRO GERAL)

- B. Dar bastante água misturada com suco de laranja e/ou de limão
C. Provocar vômito com água e sal
D. Nenhuma das alternativas anteriores
- 12. A sensação de deslocamento do corpo em relação aos objetos ou vice-versa, além de náuseas e sensação de zumbidos nos ouvidos, sem perda da consciência, são sintomas característicos de:**
A. Lipotimia
B. Síncope
C. Coma
D. Vertigem
- 13. A compressa quente visa promover ba-sicamente a:**
A. Vasoconstrição
B. Pneumoconstrição
C. Vasodilatação
D. Todas estão correctas
- 14. A posição de Trendelenburg é indicada, entre outras, para:**
A. Melhorar a troca gasosa nos pulmões
B. Melhorar a circulação de retorno dos membros inferiores
C. Diminuir a tosse produtiva
D. Nenhuma das alternativas anteriores
- 15. O choque anafilático é provocado pela:**
A. Presença de pirogênio no medicamento
B. Superdosagem de medicação
C. Não aceitação do organismo em relação ao medicamento
D. Nenhuma das alternativas anteriores
- 16. Os ossos movimentam-se em relação uns aos outros através de:**
A. Cartilagens
B. Curvas
C. Nervos
D. Músculos
E. Articulações
- 17. O termo utilizado para denominar retenção de gases no estômago e no intestino é:**
A. Anosmia
B. Sialorréia
C. Tenesmo
D. Meteorismo
- 18. No exame da pele de um paciente podemos encontrar lesões que constituem acúmulos sólidos circunscritos. Essas lesões são denominadas:**
A. Abscessos
B. Hematomas
C. Pústulas
D. Flictenas
- 19. A catecterização nasogástrica tem por finalidades:**
A. Evitar diarréia e manter equilíbrio hidroeletrólítico
B. Reduzir estresse e evitar constipação intestinal
C. Retirar os fluidos do trato gastrointestinal e administrar medicamentos e alimentos (gavagem)
D. Evitar constipação intestinal e prevenir desconforto gástrico
- 20. Em pacientes acamados com incontinência urinária, o cuidado mais importante de enfermagem inclui:**
A. Controle rigoroso de diurese
B. Restrição rigorosa de líquidos
C. Troca programada da roupa do leito
D. Cateterismo vesical
- 21. O cuidado de enfermagem a ser prestado ao paciente, na colheita de escarro para baciloscopia, é:**
A. Fazer bochechos de água e ingerir a seguir
B. Escovar os dentes e lavar a boca
C. Colocar o material em recipiente limpo
D. Promover meios para evitar a tosse
- 22. Ao prestar cuidados de emergência a um paciente que sofreu uma fratura, deve-se:**



ISCISA –EXAME DE ADMISSÃO ENFERMAGEM GERAL(SÓ PARA ENFERMEIRO GERAL)

- A. Transportar o paciente em decúbito dorsal para proteger a fratura
B. Imobilizar o membro fraturado para transportar o paciente
C. Administrar sedativo para diminuir o estresse
D. Nenhuma das alternativas anteriores
- 23. O ponto básico da assistência de enfermagem com prioridade sobre todos os demais cuidados ao paciente com insuficiência respiratória é:**
A. Manutenção das vias aéreas desobstruídas
B. Utilização de oxigênio nasal
C. Observação rigorosa da frequência respiratória
D. Humidificação do gás a ser administrado
- 24. São sinais de hipoglicemia, além da sudorese:**
A. Sonolência e hálito cetônico
B. Palidez e taquicárdia
C. Sonolência e bradicárdia
D. Hálito cetônico e cefaléia
- 25. Quando o paciente está com hipoglicemia, ele deve:**
A. Receber glicose
B. Ir ao hospital imediatamente
C. Ficar deitado em decúbito lateral
D. Tomar insulina habitual
- 26. Um dos objectivos do uso de ataduras é:**
A. Favorecer a cicatrização da área lesada
B. Restringir ou impedir movimentos
C. Impedir a propagação de infecção em feridas sépticas
D. Economizar material esterilizado
- 27. É necessário fazer a colecta de escarro para cultura pela manhã, porque neste período o paciente está:**
A. Com expectoração abundante
B. Descansado
C. Hidratado
D. Nenhuma das alternativas anteriores
- 28. Para realizar de maneira eficiente a respiração pelo método boca a boca, devemos colocar o paciente na posição:**
A. Sentado
B. Em pé
C. Deitado em decúbito lateral
D. Deitado em decúbito dorsal
- 29. A dor é uma das maiores causas de desconforto, que pode ser identificada através da conduta verbal e não-verbal. Se possível, deve-se estimular o paciente à descrição de sua dor, com o objectivo principal de identificar as seguintes características:**
A. Localização, intensidade e qualidade.
B. Profundidade, localização e duração.
C. Localização, difusão e intensidade.
D. Profundidade, qualidade e duração.
- 30. Para que uma substância possa ser administrada por via intravenosa é essencial que:**
A. Não seja hemolítica
B. Seja cáustica
C. Não seja de fácil absorção
D. Contenha pirogênio
- 31. O primeiro cuidado a ser dado em caso de hemorragia externa por acidente é prioritariamente:**
A. Instalar soro removendo a vítima do local
B. Cobrir o sangramento, apertando com firmeza o vaso afetado.
C. Manter o volume sanguíneo através de transfusão
D. Imobilizar o membro lesado para diminuir a perda de sangue
- 32. São complicações dos usuários de insulina:**
A. Dor no local da aplicação
B. Lipodistrofia insulínica
C. Edema insulínico
D. Somente B e C estão corretas



33. Na desinfecção por glutaraldeído a 2% o cuidado prévio com os materiais é fazer:

- A. Limpeza
- B. Estocagem
- C. Esterilização
- D. Registo

34. A acção de enfermagem imediata, prestada a um paciente que será submetido à intubação orotraqueal, é:

- A. Fixar o tubo
- B. Providenciar aspirador
- C. Humedecer a região local
- D. Retirar prótese dentária

35. A tapotagem tem, entre outros objectivos, o de melhorar a capacidade ventilatória, devendo ser praticada em pacientes no caso de:

- A. Coma diabético
- B. Transoperatório
- C. Insuficiência renal
- D. Secreção brônquica

36. Ao suspeitar de uma reacção transfusional num paciente que esteja a receber hemoderivados, o enfermeiro deverá adoptar as seguintes atitudes:

- A. Manter a transfusão, chamar o médico e aquecer o paciente.
- B. Manter a transfusão, guardar a embalagem do sangue e aquecer o paciente.
- C. Interromper a transfusão, desprezar a embalagem de sangue e comunicar ao médico.
- D. Interromper a transfusão, comunicar ao enfermeiro chefe e guardar a embalagem do sangue.

37. Colocar o paciente erecto com pernas e pés para baixo, administrar oxigênio, aplicar torniquetes rotativos e administrar medicação prescrita são cuidados de enfermagem adequados à seguinte situação:

- A. Hemotórax
- B. Bronquiectasia
- C. Enfisema pulmonar
- D. Edema agudo de pulmão

38. Em relação à aplicação de calor local, indique a opção incorreta:

- A. Alivia espasmos musculares
- B. Estimula a circulação e as glândulas sudoríparas
- C. Acelera o processo de supuração.
- D. Produz a vasoconstrição

39. Na administração de medicamentos por via oral, não é indicado:

- A. Colocar os medicamentos em copinhos ou caixinhas.
- B. Perguntar o nome do paciente e certificar-se disso com o cartão ou relatório de enfermagem
- C. Deixar o medicamento sobre a mesinha do paciente, quando ele estiver ausente.
- D. Lavar os copinhos com água e sabão